



1 Augen

1.1 Bindehautentzündung

Beschreibung, Ursache

Die Entzündung der Lidbindehäute (Konjunktivitis) kann durch Staub, Zugluft, Fremdkörper, Verletzungen sowie durch Infektionen und allergische Reaktionen verursacht werden.

Symptome

Schwellung der Lider, Rötung der Bindehäute, verstärkter Tränenfluss, Augenausfluss (schleimig bis eitrig), verklebte Augenlider, Lichtscheu, Juckreiz.

Allgemeine Behandlungsmaßnahmen

Beseitigung der Ursache, entzündungshemmende Maßnahmen, Vermeidung von Staub und Zugluft.

Therapie

▶ Belladonna D6 = Hauptmittel

Akute Bindehautentzündung, Augen hochrot, trocken, keine Tränen, Lichtscheu. Alle Beschwerden kommen plötzlich, sind heftig, heiß, klopfend und pulsierend. Die klassischen Entzündungszeichen sind Leitsymptome für diese Arznei (Rötung, Schwellung, Hitze, Schmerz, Berührungsempfindlichkeit). Belladonna ist ein sehr bewährtes Mittel für akute, lokale Entzündungen sowie für fieberhafte Infekte.

- **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

▶ Apis D6

Besonders indiziert bei allergisch bedingter Konjunktivitis, akute Bindehautentzündung, Lider geschwollen, wässrig, rot, akute Entzündung mit Schwellungen und stechenden, brennenden Schmerzen, Tränenfluss, Lichtscheu, starke Berührungsempfindlichkeit, Augenerkrankungen, entzündliche und nicht entzündliche Ödeme, allergische Entzündungen, Besserung durch kühlende Anwendungen (kalte Kompressen).

- **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

▶ **Euphrasia D6**

Akute und chronische Bindehautentzündung, Bindehäute rot, geschwollen, Folge von Sonneneinstrahlung, Wind, Zugluft und Augenverletzungen, allergische Entzündung, starker Tränenfluss, wundmachender Augenausfluss, Lichtscheu, sehr gut als Augentropfen bei spezifischen und unspezifischen Bindehautentzündungen einsetzbar.

■ **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

▶ **Hepar sulfuris D30**

Eitriges Bindehautentzündung mit Schwellung, Schmerzhaftigkeit und großer Empfindlichkeit gegen Luft und Berührung, Absonderungen mild, eitrig, stark, alle eitriges Entzündungen, akute Entzündung mit Neigung zur Eiterung, starke Berührungsempfindlichkeit, Beschwerden schlechter durch Kälte, besser durch Wärme.

■ **Empfohlene Dosierung:** 1 × täglich 1 Gabe

▶ **Mercurius solubilis D30**

Akute und chronische Bindehautentzündung, Lider rot, dick, geschwollen, schmerzhaft, Neigung zur Eiterung, Augenausfluss reichlich, brennend, schleimig, eitrig.

■ **Empfohlene Dosierung:** 1 × täglich 1 Gabe

▶ **Pulsatilla D30**

Eitriges Bindehautentzündung, Lider entzündet, verklebt, Tränenfluss und Schmerzen in den Augen, Juckreiz, Augenausfluss eitrig, mild, gelb, dick, reichlich.

■ **Empfohlene Dosierung:** 1 × täglich 1 Gabe

1.2 Equine rezidivierende Uveitis (ERU)

Beschreibung

Die equine rezidivierende Uveitis – auch periodische Augenentzündung oder Mondblindheit genannt – ist eine Entzündung von Iris, Ziliarkörper und/oder Aderhaut (Iritis-Zyklitis-Chorioiditis), ggf. verbunden mit einer Hornhaut- und Bindehautentzündung. Bei einigen Tieren bleibt die Entzündung lange unbemerkt und die Krankheit wird erst erkannt, wenn das Pferd Sehstörungen zeigt. Es können ein oder beide Augen betroffen sein. Die ERU tritt anfallsweise auf und neigt zur Rückfälligkeit. Daneben beobachtet man auch eine chronisch schleichende Verlaufsform. Jeder Rückfall schädigt das Auge zusätzlich. In den meisten Fällen kommt es durch eine fortschreitende Schädigung von Augeninnenstrukturen zur Atrophie und Erblindung des betroffenen Auges.

Ursache

Infektion des Innenauges mit Leptospiren.

Symptome

Engstellung der Pupille, starke Lichtempfindlichkeit, Tränenfluss, geschwollene Lider, Schmerzhaftigkeit des Auges, Trübung der Hornhaut, Fibrinausschwitzungen in der vorderen Augenkammer, Verklebungen der Iris mit der Linse, Veränderungen von Linse und Glaskörper, gelegentlich Fieber.

Allgemeine Behandlungsmaßnahmen

Weitstellen der Iris (Tierarzt!), entzündungshemmende Maßnahmen, Aufstallern in dunklen Räumen. Vitrektomie (Glaskörper-OP) zur Verhinderung weiterer Schübe. Bei der akuten periodischen Augenentzündung sollte unbedingt ein Tierarzt zugezogen werden!

Therapie

▶ **Aconitum D6 = Anfangsmittel**

Im **akuten Anfangsstadium** der periodischen Augenentzündung, **plötzlicher, heftiger Beginn**, Augen rot, geschwollen, reichlicher Tränenfluss, starke Berührungsempfindlichkeit, Lichtscheu, gestörtes Allgemeinbefinden.

■ **Empfohlene Dosierung:** alle 2 Stunden 1 Gabe (4 ×)

▶ **Belladonna D6 = Hauptmittel**

Periodische Augenentzündung, plötzlicher Beginn, heftiger Anfall, Aderhautentzündung (Chorioiditis), Regenbogenhautentzündung (Iritis), Augen hochrot, trocken, keine Tränen, Lider geschwollen, Lichtscheu, Bindehautentzündung, alle Beschwerden kommen plötzlich, sind heftig, heiß, klopfend und pulsierend, Berührungsempfindlichkeit. Die klassischen Entzündungszeichen sind Leitsymptome für diese Arznei (Rötung, Schwellung, Hitze, Schmerz). Belladonna ist ein sehr bewährtes Mittel für akute, lokale Entzündungen sowie für fieberhafte Infekte.

■ **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe, im akuten Anfall alle 2 Stunden 1 Gabe

▶ **Bryonia D6**

Periodische Augenentzündung, Regenbogenhautentzündung (Iritis), Aderhautentzündung (Chorioiditis), starke Schmerzhaftigkeit des Augapfels, Berührungsempfindlichkeit, wenig Tränen. Bryonia kann gut im Wechsel mit Belladonna gegeben werden.

■ **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

▶ **Euphrasia D6**

Regenbogenhautentzündung (Iritis), allergisch bedingte Augenentzündungen, Bindehäute rot, geschwollen, starker Tränenfluss, wundmachender Augenausfluss, Lichtscheu, Brennen und Juckreiz der Augen, Folge von Sonneneinstrahlung, Wind, Zugluft und Augenverletzungen, Bindehautentzündung, Hornhautentzündung, Tränensackentzündung.

Gut mit Belladonna zu verabreichen.

■ **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

▶ **Mercurius corrosivus D30**

Regenbogenhautentzündung (Iritis), extreme Lichtscheu, scharfer Tränenfluss, Lider geschwollen, rot, Schmerzhaftigkeit der Augen, Bindehautentzündung, Hornhautentzündung.

■ **Empfohlene Dosierung:** 1 × täglich 1 Gabe

▶ **Rhus toxicodendron D30**

Regenbogenhautentzündung (Iritis), allergisch-rheumatoide Entzündungen, Augen rot, geschwollen, Lider entzündet, verklebt, Lichtscheu, starker Tränenfluss, Schmerzhaftigkeit der Augen, Hornhautentzündung.

■ **Empfohlene Dosierung:** 1 × täglich 1 Gabe

■ **CAVE Grenzen der Selbstmedikation beachten!**

**16 Unfall, Verletzung,
Erste Hilfe**

16

16.1 Unfall

Therapie

▶ Arnika D30 = Hauptmittel

Kann **sofort nach jeder Art von Unfall** gegeben werden, Hauptmittel bei Verletzungen aller Art, lindert Schmerzen, fördert Blutstillung, verbessert Wundheilung, beugt Schockzuständen vor, vor jeder Operation, Gehirnerschütterung, Beschwerden: schlechter durch Bewegung, Berührung und Erschütterung, besser durch Ruhe.

- **Empfohlene Dosierung:** im akuten Fall stündlich 1 Gabe (4 ×)

▶ Aconitum D200

Verletzungsschock, Kollaps, Ohnmacht, **Panik, Schock durch Schreck.**

- **Empfohlene Dosierung:** 1 Gabe

▶ Hypericum D30

Gehirnerschütterung, **Nervenverletzungen**, offene und stumpfe Verletzungen, Verletzungen aller Art, insbesondere Verletzungen von nervenreichen Geweben, Folgen von Schock, Rückenmarkerschütterung und -verletzung, große Schmerzhaftigkeit.

- **Empfohlene Dosierung:** im akuten Fall stündlich 1 Gabe (4 ×)

- **CAVE Grenzen der Selbstmedikation beachten!**

16.2 Blutung

Therapie

▶ Arnika D30 = Hauptmittel

Blutungen, Folgen von Verletzung, Schlag, Stoß, Sturz, Hauptmittel bei Verletzungen aller Art, lindert Schmerzen, fördert Blutstillung, verbessert Wundheilung, beugt Schockzuständen vor, kann sofort nach jeder Art von Unfall gegeben werden, Bluterguss, Beschwerden: schlechter durch Bewegung, Berührung und Erschütterung, besser durch Ruhe.

- **Empfohlene Dosierung:** akut alle 15 Minuten 1 Gabe

▶ Hamamelis D4

Blutungen, dunkel, venös, langsam, gleichmäßig fließend, Bluterguss.

- **Empfohlene Dosierung:** akut alle 15 Minuten 1 Gabe

▶ Millefolium D4

Blutungen, hellrot, reichlich, aus Organen, Wunden, Gefäßen, Folge von Verletzungen.

- **Empfohlene Dosierung:** akut alle 15 Minuten 1 Gabe

▶ Phosphorus D30

Blutungen, hell, reichlich, aus Organen, Wunden, Gefäßen, Neigung zu Blutungen, kleine Wunden bluten stark.

- **Empfohlene Dosierung:** akut alle 15 Minuten 1 Gabe

- **CAVE Grenzen der Selbstmedikation beachten!**

16.3 Bluterguss

Therapie

▶ Arnika D6 = Hauptmittel

Bluterguss, Folgen von Blutungen, Folgen von Verletzung, Schlag, Stoß, Sturz, Hauptmittel bei Verletzungen aller Art, lindert Schmerzen, fördert Blutstillung, verbessert Wundheilung, beugt Schockzuständen vor, kann sofort nach jeder Art von Unfall gegeben werden, Beschwerden: schlechter durch Bewegung, Berührung und Erschütterung, besser durch Ruhe.

- **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe

▶ Hamamelis D30

Bluterguss, Blutungen, venös, passiv, dunkel, gleichmäßig fließend, Prellungen, offene, schmerzhafte Wunden, Folgen von Stoß, Schlag, Verwundung.

- **Empfohlene Dosierung:** 1 × täglich 1 Gabe

▶ Symphytum D6

Bluterguss, Prellung, Quetschung, Verstauchung, Verletzungen durch stumpfe Gegenstände führen zu schmerzhaften Prellungen und Blutergüssen.

- **Empfohlene Dosierung:** 3 × täglich 1 Gabe