

Läuse

- Anwendung eines Läusemittels, Wdh. nach 8–10 Tagen
- + nasses Auskämmen (alle 4 Tage)
- **!** Ausreichende Menge des Mittels
- **!** Empfohlene Einwirkzeit einhalten

Behandlung

- Kontrolle und Behandlung aller Familienmitglieder
- Auskämmen mittels Nissenkamm, nach Haarspülung mit Essigwasser
- Gegenstände waschbar: >60°C waschen
- Gegenstände nicht waschbar: Isolieren im Plastiksack (3 Tage bei RT oder 48 h tiefkühlen)
- Vorsorge durch Abwehrbehandlung
- Meldepflicht an öffentl. Einrichtungen

Beratungstipps

Wann zum Arzt

- Bei Unklarheit zur Diagnosesicherung
- Behandlungsbescheinigung für öffentl. Einrichtungen, falls gefordert
- Säuglinge und Kleinkinder
- Bei weiteren Erkrankungen der Kopfhaut oder wundgekratzten Stellen

Wirkstoffe

Dimeticon

Einwirkzeit: 60 min
(im trockenen Haar)
! brennbar: Cave Fön

Pyrethrum

Einwirkzeit: 30–45 Min.

Permethrin

Einwirkzeit: 30–45 Min.
(**!** einige Tage kein Haarewaschen)

Allethrin

Einwirkzeit: 30 Min.

Präparatebeispiele

Therapie

Dimeticon (physikalisch wirksam)

Nyda® plus Lösung → Anwendungsempfehlung: ab 2 J.

Pyrethrum (insektizid)

Goldgeist® forte Flüssigkeit (WG Pyrethrine 25 %) → Anwendungsempfehlung: ab 1 J., darunter unter ärztl. Aufsicht

Permethrin (insektizid)

InfectoPedicul® Lösung (WG 0,43 mg/ml) → Päd. Zul.: >3 J., 2 Mon. bis 3 J. nur unter ärztl. Aufsicht

Allethrin (insektizid)

Jacutin® Pedicul Spray (WG 0,413 mg/ml) → Anwendungsempfehlung: ab 1 J.

Prophylaxe

Rausch Weidenrinden® Shampoo (Weidenrinden-Destillat, Thymianöl)